

Prescription médicale d'Activité Physique Adaptée

Critères ouvrant droit à la prescription médicale
d'une activité physique adaptée



1

Maladies chroniques

- Ayant un retentissement sur la vie quotidienne, susceptibles de générer des incapacités, voire des complications graves, et nécessitant une prise en charge au long cours

2

Facteurs de risque

- Condition, pathologie ou comportement augmentant la probabilité de développer ou d'aggraver une maladie ou bien de souffrir d'un traumatisme, notamment le surpoids, l'obésité, l'hypertension artérielle, la dénutrition, la sédentarité, les dyslipidémies, et les conduites addictives

3

Perte d'autonomie dues au handicap ou au vieillissement

- Bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie,
- Bénéficiaire de l'aide à domicile,
- Bénéficiaire d'un droit attribué par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées,
- Titulaire de la carte " mobilité inclusion "
- Dépistage multidimensionnel du déclin fonctionnel lié à l'âge révélant une fragilité.



ANNEXE 2 – TABLEAU DES PHENOTYPES FONCTIONNELS DES PATIENTS ATTEINTS D’UNE AFFECTION DE LONGUE DUREE

TABLEAU DES PHENOTYPES FONCTIONNELS				
Fonctions	Aucune limitation	Limitation minime	Limitation modérée	Limitation sévère
Fonction musculaire	neuro Normale	Altération minime de la motricité et du tonus	Altération de la motricité et du tonus lors de mouvements simples	Altération de la motricité et du tonus affectant la gestuelle et l’activité au quotidien
Fonction articulaire	ostéo Normale	Altération au max de 3/5 d'amplitude, sur une ou plusieurs articulations sans altération des mouvements complexes	Altération à plus de 3/5 d'amplitude sur plusieurs articulations avec altération des mouvements simples	Altération d'amplitude sur plusieurs articulations, affectant la gestuelle et l’activité au quotidien
Endurance à l’effort	Pas ou peu de fatigue	Fatigue rapide après une activité physique intense	Fatigue rapide après une activité physique modérée	Fatigue invalidante dès le moindre mouvement
Force	Force normale	Baisse de force, mais peut vaincre la résistance pour plusieurs groupes musculaires	Ne peut vaincre la résistance pour un groupe musculaire	Ne peut vaincre la résistance pour plusieurs groupes musculaires
Marche	Distance théorique normale couverte en 6mn = $218 + (5,14 \times \text{taille en cm}) - (5,32 \times \text{âge en années}) - (1,80 \times \text{poids en kg}) + (51,31 \times \text{sexe})$, avec sexe=0 pour les femmes, sexe=1 pour les hommes.	Valeurs comprises entre la distance théorique et la limite inférieure de la normale (82% de la distance théorique)	Valeurs inférieures à la limite inférieure de la normale	Distance parcourue inférieure à 150 m.

Fonctions locomotrices

ANNEXE 2 – TABLEAU DES PHENOTYPES FONCTIONNELS DES PATIENTS ATTEINTS D’UNE AFFECTATION DE LONGUE DUREE

Fonctions sensorielles + douleur		Fonctions sensorielles		Fonctions cérébrales	
		Capacité auditive	Capacités proprioceptives	Fonctions cérébrales	Anxiété/Dépression
Fonctions cognitives	Bonne stratégie, vitesse normale, bon résultat	Bonne stratégie, lenteur, adaptation possible, bon résultat	Bonne stratégie, lenteur, adaptation possible, bon résultat	Mauvaise stratégie de base, adaptation, résultat satisfaisant ou inversement bonne stratégie de base qui n'aboutit pas	Mauvaise stratégie pour un mauvais résultat, échec
Fonctions langagières	Aucune altération de la compréhension ou de l'expression	Altération de la compréhension ou de l'expression lors d'activités en groupe	Altération de la compréhension ou de l'expression lors	Altération de la compréhension ou de l'expression lors d'activités en individuel	Empêche toute compréhension ou expression
	Ne présente aucun critère d'anxiété et/ou de dépression	Arrive à gérer les manifestations d'anxiété et/ou de dépression	Se laisse certaines manifestations d'anxiété dépression	Se laisse certaines manifestations d'anxiété et/ou de dépression	Présente des manifestations sévères d'anxiété et/ou de dépression
Capacité visuelle	Vision des petits détails à proche ou distance	Vision perturbant la lecture et l'écriture mais dans l'environnement perturbée	Vision perturbant la lecture et l'écriture mais dans un environnement familier	Vision ne permettant pas la lecture et l'écriture / circulation possible dans un environnement non familier	Vision ne permettant pas la lecture ni l'écriture. Circulation seul impossible dans un environnement non familier
Capacité sensitive	Stimulations sensitives perçues et localisées	Stimulations sensitives perçues mais mal localisées	Stimulations sensitives perçues mais localisées	Stimulations sensitives perçues mais non localisées	Stimulations sensitives non perçues, non localisées.
Capacité auditive	Pas de perte auditive.	La personne fait répéter.	Surdité moyenne. La personne comprend si l'interlocuteur élève la voix	Surdité moyenne. La personne comprend si l'interlocuteur élève la voix	Surdité profonde
Capacités proprioceptives	Équilibre respecté	Déséquilibre avec rééquilibrages rapides	Déséquilibres compensés avec rééquilibrages difficiles	mal avec	Déséquilibres sans rééquilibrage fréquentes lors des activités au quotidien
Douleur	Absence de douleur en dehors d'activités physiques intenses	Douleur à l'activité physique/ Indolence à l'arrêt de l'activité	Douleur à l'activité physique et qui se poursuit à distance de l'activité	Douleur constante avec ou sans activité	Douleur constante avec ou sans activité